

# CORONA-IMPfstoffe im Überblick



Grund-immunisierung	Impfempfehlung nach Alter					Impfempfehlung besondere Gruppen						
	6 Monate – 4 Jahre	5-11 Jahre	12-17 Jahre	18-29 Jahre	> 30 Jahre	Schwangere	Stillende	Menschen mit Immunschwäche	Infizierte/Genesene (Impfstoff je nach Alter/Risikogruppe)			
Mögliche Impfstoffe	<b>mRNA Biontech/Pfizer (präferiert): Vorerkrankte Kinder und Frögeborene:</b> 3 Dosen (Kleinkinddosis! je 3 µg), Abstand 0 - 3 Wochen später - 8 Wochen später; Bei durchgemachter Infektion nur 2 Dosen	<b>mRNA Biontech/Pfizer (präferiert): Kinder mit Vorerkrankungen:</b> 2 Dosen (Kinderdosis! je 10 µg), Abstand 3-6 Wochen; <b>Kinder ohne Vorerkrankungen:</b> 1 Dosis (10 µg)	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen (30 µg), Abstand 3-6 Wochen	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen (30 µg), Abstand 3-6 Wochen	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen (30 µg), Abstand 3-6 Wochen	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> Ab 2. Trimenon, 2 Dosen (30 µg), Abstand 3-6 Wochen  Sonderfall: 1. Dosis -> Schwangerschaft -> 2. Dosis ab 2. Trimenon	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen (30 µg), Abstand 3-6 Wochen	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 2 Dosen (30 µg), Abstand 3-6 Wochen  (Kinder ab 5 Jahren mit Immunschwäche: siehe Impfempfehlungen nach Alter!)  3. Dosis (s. Auffrischung)	<b>1 Impfdosis, Infektion &lt; 4 Wochen nach Impfung:</b> bei PCR-Nachweis 1 Dosis, Abstand 3 Monate nach Infektion; bei serologischem Nachweis 1 Dosis, Abstand von 4 Wochen zur Labordiagnose  <b>1 Impfdosis, Infektion ≥ 4 Wochen nach Impfung:</b> keine weitere Dosis zur Grundimmunisierung nötig			
	<b>mRNA Moderna: Vorerkrankte Kinder und Frögeborene:</b> 2 Dosen (Kleinkinddosis 25 µg), Abstand 4 Wochen; Bei durchgemachter Infektion nur 1 Dosis	<b>mRNA Moderna: Kinder mit Vorerkrankungen:</b> 2 Dosen (halbe Dosis! je 50 µg), Abstand 4-6 Wochen; <b>Kinder ohne Vorerkrankungen:</b> 1 Dosis (50 µg)			<b>mRNA Moderna:</b> 2 Dosen (100 µg), Abstand 4-6 Wochen			<b>mRNA Moderna &gt; 30 Jahre:</b> 2 Dosen (100 µg), Abstand 4-6 Wochen	<b>mRNA Moderna &gt; 30 Jahre:</b> 2 Dosen (100 µg), Abstand 4-6 Wochen  (Kinder ab 6 Jahren mit Immunschwäche: siehe Impfempfehlungen nach Alter!)  3. Dosis (s. 1. Auffrischung)	<b>2 Impfstoffdosen danach SARS-CoV-2-Infektion:</b> keine weitere Dosis zur Grundimmunisierung nötig		
			<b>Proteinbasierter Impfstoff Novavax:</b> 2 Dosen, Abstand ≥ 3 Wochen	<b>Proteinbasierter Impfstoff Novavax:</b> 2 Dosen, Abstand ≥ 3 Wochen	<b>Proteinbasierter Impfstoff Novavax:</b> 2 Dosen, Abstand ≥ 3 Wochen						<b>SARS-CoV-2-Infektion, PCR-Nachweis:</b> 1 Dosis 3 Monate nach Infektion; <b>SARS-CoV-2-Infektion, serologischer Nachweis:</b> 1 Dosis im Abstand von 4 Wochen zur Labordiagnose	
							<b>SARS-CoV-2-Infektion, danach bereits geimpft (s.o.):</b> keine weitere Dosis zur Grundimmunisierung nötig					
<b>Auffrischung</b>	<b>5-11 Jahre</b>	<b>12-17 Jahre</b>	<b>18-29 Jahre</b>	<b>30-59 Jahre</b>	<b>&gt; 60 Jahre</b>	<b>Schwangere (selbst wenn doppelt geimpft)</b>	<b>Pflegebedürftige</b>	<b>Menschen mit Immunschwäche (3. Dosis zählt als Grundimmunisierung)</b>	<b>Infizierte/Genesene</b>	<b>Pflege-/Med. Personal mit Patientenkontakt</b>		
STIKO: möglichst mit an Omikron angepasstem Impfstoff!	<b>mRNA Biontech/Pfizer (bevorzugt!): Nur Kinder mit Vorerkrankungen!</b> 1. Auffrischung, 1 Kinderdosis (10 µg), Abstand ≥ 6 Monate  2. Auffrischung, 1 Kinderdosis (10 µg), Abstand ≥ 6 Monate, bei Immundefizienz ≥ 3 Monate	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate  <b>Bei Vorerkrankung:</b> 2. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate, bei Immundefizienz ≥ 3 Monate	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate  <b>Bei Vorerkrankung:</b> 2. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate, bei Immundefizienz ≥ 3 Monate	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate  <b>Bei Vorerkrankung:</b> 2. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate, bei Immundefizienz ≥ 3 Monate	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate  2. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate  3. Auffrischung bei Hochaltrigen <b>nur</b> nach individueller Entscheidung, Abstand ≥ 6 Monate	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1 Dosis (30 µg) ab dem 2. Trimenon	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 3 Monate  2. Auffrischung für Bewohner von Pflegeheimen 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 3 Monate	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung: 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate (schwere Immunschwäche: Abstand 4 Wochen)  (Kinder mit Immunschwäche: siehe Impfempfehlungen nach Alter!)  2. Auffrischung: 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 3 Monate (Kinder mit Immunschwäche: siehe Impfempfehlungen nach Alter!)	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1 Dosis (30 µg), Abstand 3 Monate (zu vorheriger Impfdosis oder Infektion)  (Impfempfehlungen nach Alter beachten!)	<b>mRNA Biontech/Pfizer:</b> 1. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 3 Monate  2. Auffrischung, 1 Dosis (30 µg), Abstand ≥ 6 Monate		
	<b>mRNA Moderna: Nur Kinder mit Vorerkrankungen! (ab 6 Jahren!)</b> 1. Auffrischung, Cave: 0,5 Dosis (50 µg), Abstand ≥ 6 Monate  2. Auffrischung, 0,5 Dosis, Abstand ≥ 6 Monate, bei Immundefizienz ≥ 3 Monate		<b>mRNA Moderna:</b> 1. Auffrischung, Cave: 0,5 Dosis (=0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 3 Monate  <b>Bei Vorerkrankung:</b> 2. Auffrischung, 1 Dosis (50 µg), Abstand ≥ 6 Monate, bei Immundefizienz (Cave: 100 µg!) ≥ 3 Monate,	<b>mRNA Moderna:</b> 1. Auffrischung, Cave: 0,5 Dosis (= 0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 6 Monate  2. Auffrischung, Cave: 0,5 Dosis (= 0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 6 Monate  3. Auffrischung bei Hochaltrigen <b>nur</b> nach individueller Entscheidung, Abstand ≥ 6 Monate	<b>mRNA Moderna &gt; 30 Jahre:</b> 1. Auffrischung, 0,5 Dosis (= 0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 3 Monate  2. Auffrischung für Bewohner von Pflegeeinrichtungen, 0,5 Dosis (=0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 3 Monate			<b>mRNA Moderna &gt; 30 Jahre:</b> 1. Auffrischung / 3. Dosis: 0,5 Dosis (= 0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 6 Monate (schwere Immunschwäche: Abstand 4 Wochen)  (Kinder mit Immunschwäche: siehe Impfempfehlungen nach Alter!)  2. Auffrischung Abstand ≥ 3 Monate Cave: volle Dosis (100 µg)	<b>mRNA Moderna &gt; 30 Jahre:</b> 0,5 Dosis mRNA Moderna (= 0,25 ml) Abstand 3 Monate (zu vorheriger Impfdosis oder Infektion)	<b>mRNA Moderna &gt; 30 Jahre:</b> 1. Auffrischung, 0,5 Dosis (= 0,25 ml, 50 µg), Abstand ≥ 3 Monate  2. Auffrischung, 0,5 Dosis (= 0,25 ml, 50 µg), Cave: Abstand ≥ 6 Monate		
			<b>Proteinbasierter Impfstoff Novavax (in Einzelfällen, mRNA bevorzugt!)</b>	<b>Proteinbasierter Impfstoff Novavax (in Einzelfällen, mRNA bevorzugt!)</b>	<b>Proteinbasierter Impfstoff Novavax (in Einzelfällen, mRNA bevorzugt!)</b>							